DERMATOGRILLA

Alopecia areata


Alopecia areata

Complete la grilla y descubra las siglas

Mariángeles Jofré y Lucía Nicola Unidad de Dermatología, Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, CABA, Argentina

Contacto del autor: Lucía Nicola E-mail: lucianicola@hotmail.com.ar Fecha de trabajo recibido: 13/3/2017 Fecha de trabajo aceptado: 31/3/2017

Dermatol. Argent. 2017, 23 (2):102-103



HORIZONTALES

- Sustancia responsable de la presencia de puntos amarillos en la dermatoscopia
- 5. Tratamiento de primera línea para AA leve (2 PALABRAS)
- Células que rodean al bulbo piloso en la fase aguda de la enfermedad
- 12. Enfermedad cromosómica a la que se asocia (3 PALABRAS)
- 13. Cantidad de pelos que deben desprenderse en el *pull* test para ser positivo
- 15. Compromiso unqueal más frecuente
- 16. Etiología
- 20. Según la clasificación de gravedad: presencia de 3 o menos placas menores a 3 cm

- 23. Tipo de alopecia (2 PALABRAS)
- 24. Glucocorticoide tópico de elección
- 25. Según la clasificación de gravedad: presencia de 3 o más placas mayores a 3 cm
- 29. Enfermedad cutánea autoinmune a la que se asocia
- 30. Célula encargada de transformar el minoxidil a su metabolito activo sulfato de minoxidil
- 31. Desencadenante
- 32. Tratamiento fototerápico
- 33. Hallazgo histológico característico de la fase crónica de la enfermedad

VERTICALES

- Enfermedad hematológica autoinmune a la que se asocia (2 PALABRAS)
- 3. Diagnóstico diferencial
- 4. Método de estudio no invasivo
- 6. Diagnóstico diferencial (2 PALABRAS)
- 7. Desencadenante
- 8. Glucocorticoide intralesional de primera línea
- 10. Tipo de alopecia areata que afecta la totalidad del cuero cabelludo
- 11. Tipo de alopecia areata que afecta todo el cuerpo
- 14. Inmunomodulador sistémico utilizado en el tratamiento
- 17. Pelos cortos en forma de signo de exclamación invertido, delgados en la zona proximal y anchos en la zona distal, encontrados en el borde de las placas alopécicas (2 PALABRAS)

- 18. Sustancia derivada del alquitrán utilizada por su acción irritante en el tratamiento
- Según la clasificación de gravedad: presencia de alopecia total o universal
- 21. Compromiso ungueal
- 22. Tricoscopía característica del pelo anágeno en esta enfermedad
- 26. Inmunomodulador tópico utilizado en el tratamiento
- 27. Fase del ciclo piloso afectada
- 28. Tipo de alopecia areata que afecta el área occipital

	14. Ciclosporina		L3. No cicatrizal
	11. Universal		20. Leve
28. Оћа́сеа	16.Total		anumniotuA .df
onaganA .72	8. Triamcinolona	33. Miniaturización	ls. Pitting
26. Difenciprona	5. Anemia	32. PUVA	zəiQ .£ſ
D2. Distrófico	6. Tiña capitis	31. Estrés	12. Síndrome de Down
21. Traquioniquia	4. Tricoscopia	30. Queratinocito	9. Linfocitos
19. Severa	3. Tricotilomanía	29. Vitiligo	5. Corticoide intralesional
18. Antralina	2. Anemia perniciosa	25. Moderada	1. Queratina
17. Pelos peládicos	VERTICALES	losetazol . Δ4. Clobetazol	HORIZONTALES

RESPUESTAS DERMATOGRILLA

BIBLIOGRAFÍA

- Alkhalifah A, Alsantali A, Wang E, McElwee K, et ál. Alopecia areata update: Part II. Treatment. J Am Acad Dermatol 2010;62:191-202.
- Chu SY, Chen YJ, Tseng WC, Lin MW, et ál. Comorbidity profiles among patients with alopecia areata: The importance of onset age, a nationwide population-based study. J Am Acad Dermatol 2011;65:949-956.
- Alkhalifah A. Alopecia areata update. *Dermatol Clin* 2013;31:93-108.
- Andrew FA, Raghunandan D, Animesh A. Alopecia areata: autoimmune basis of hair loss. Eur J Dermatol 2004;14:364-370.