


Prurito

Pruritus

Cecilia Lamas¹, Yamina Julian¹, Mariana Arias¹



Fecha de recepción: 14/8/2009 | **Fecha de aprobación:** 2/2/2010

1. Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich". CABA, Rep. Argentina.

Correspondencia

Dra. Cecilia L. Lamas: Mitre 2239, (1611) Don Torcuato, Tigre, Buenos Aires, Rep. Argentina | celamas@hotmail.com

Definiciones

Horizontales

2. Alteración del metabolismo fosfocálcico que intervendría en la fisiopatogenia del prurito renal.
5. Región corporal que afecta de forma característica el prurito colestásico.
6. Denominación del prurito originado en el SNC.
8. Linfoma que puede ocasionar prurito nocturno generalizado, escalofríos, sudoración y fiebre.
10. Enfermedad que causa prurito que debe ser descartada cuando están afectados varios miembros de la familia.
13. Denominación del signo orientador de prurito de causa psicógena, cuando se observa ausencia de lesiones en dorso medio superior de tronco ya que no se alcanza este sitio para rascado.
14. Época del año en la que se presenta con mayor frecuencia el prurito senil.
19. Mediador periférico de la inflamación que actúa con mayor potencia relativa frente al prurito, el dolor, la vasodilatación y la permeabilidad vascular.
20. Patología de la vía biliar que causa hasta el 80% del prurito hepático o colestásico (sigla).
21. Enfermedad que ocasiona prurito por enfriamiento de la piel tras salir del baño, además del prurito acuagénico idiopático.
22. Neoplasia maligna que se asocia con prurito de los orificios nasales.
23. Tratamiento tópico utilizado exitosamente en diversos trastornos dermatológicos que actúa favoreciendo la liberación, y secundariamente inhibiendo la reaccumulación, de neuropéptidos.
24. Enfermedad metabólica que causa con mayor frecuencia prurito. Dos palabras.
26. Antihistamínico con potencial antieosinofílico que puede ser más eficaz en pacientes HIV que presentan prurito.
27. Clase de foliculitis a descartar en pacientes HIV que presentan prurito.
28. Células estimuladas por la sustancia P a través de los receptores de la neuropeptidina 1 (NK1).
29. Tratamiento oral que se indica en pacientes con prurito colestásico por su función de unión con sales biliares en la luz intestinal.

Verticales

1. Denominación del prurito originado en la piel.
3. Hormona cuyos niveles se encuentran aumentados en pacientes dializados que presentan prurito.
4. Tratamiento vía oral utilizado en pacientes con prurito renal que puede dar teratogenicidad como efecto adverso.
7. Enfermedad cutánea de causa inflamatoria que causa prurito generalizado intermitente en hasta el 84% de los pacientes.
9. Cantidad de años en que el prurito puede preceder a la aparición del linfoma de Hodgkin.
11. Denominación del prurito crónico, infrecuente e intermitente, de la extremidad superior.
12. Variante crónica de leucemia que presenta prurito generalizado.
15. Sigla del nevo congénito verrugoso que puede cursar con prurito.
16. Tratamiento más eficaz para un paciente con prurito renal.
17. Causa de prurito que no provoca despertares nocturnos.
18. Siglas de la dermatopatía inflamatoria pruriginosa que se presenta en el 3er trimestre del embarazo con lesiones urticarianas.
25. Percepción de prurito provocada por estímulos mecánicos en la piel circundante a la piel inflamada.

Bibliografía recomendada

1. Wood GS, Reizner G. Other Papulosquamous disorders. En: Bologna JL, Jorizzo JL, Rapini RP et al. *Dermatology*, 2nd Edition. Editorial Elsevier, Madrid. 2008;2:81-114.
2. Weisshaar E, Kucenic MJ, Fleischer AB Jr. Pruritus: a review. *Acta Derm Venereol Suppl* 2003;213:5-32.
3. Zyrwas MJ, Seraly MP. Pruritus of unknown origin: a retrospective study. *J Am Acad Dermatol* 2001;45:892-896.
4. Polat M, Oztas P, Ilhan MN, Yalçin B, et al. Generalized pruritus: a prospective study concerning etiology. *Am J Clin Dermatol* 2008;9:39-44.